

CDDP+GEM

対象の疾患		非小細胞肺癌													
治療内容	投与順	薬剤	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール									
						1日目	・・・	8日目	・・・	21日目					
	No1	ソルデ [®] M3A	500mL	120分	i.v	●									
	No2	パロ/セトロン	0.75mg	30分	i.v	●									
		デキサメタゾン	9.9mg												
		ホスアプレピタント	150mg												
	No3	グラニセトロン	3mg	30分	i.v			●							
		デキサメタゾン	9.9mg												
	No4	ソルデ [®] M3A	500mL	120分	i.v	●									
		硫酸Mg補正液	10mEq												
	No5	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	i.v	●		●							
		生理食塩液	100mL												
	No6	20%マンニトール	300mL	60分	i.v	●									
	No7	シスプラチン	80mg/m ²	120分	i.v	●									
		生理食塩液	500mL												
	No8	ソルデ [®] M3A	500mL	120分	i.v	●		●							
	No9	ソルデ [®] M3A	500mL	120分	i.v	●									
		硫酸Mg補正液	10mEq												
総投与時間		180~540分													
1サイクル期間		21日間													
ポスト・プレ メディケーション		制吐剤として下記の内服を検討する ・オランザピン錠5mg/day(Day1-4)													
根拠文献															
その他															