

CDDP+PEM

対象の疾患		非小細胞肺癌													
治療内容	投与順	薬剤	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール									
	No1	ソルデム3A	500mL	120分	i.v	●									
	No2	パロセトロン	0.75mg	30分	i.v	●									
		デキサメタゾン	9.9mg												
		ホスアプレピタント	150mg												
	No3	ソルデム3A	500mL	120分	i.v	●									
		硫酸Mg補正液	10mEq												
	No4	ペムレキセト	500mg/m ²	10分	i.v	●									
		生理食塩液	100mL												
	No5	20%マンニトール	300mL	60分	i.v	●									
	No6	シスプラチン	75mg/m ²	120分	i.v	●									
		生理食塩液	500mL												
	No7	ソルデム3A	500mL	120分	i.v	●									
	No8	ソルデム3A	500mL	120分	i.v	●									
		硫酸Mg補正液	10mEq												
総投与時間		540分													
1サイクル期間		21日間													
ポスト・プレ メディケーション		PEM ・ビタミンB12・1mgを筋注（9週毎） 投与7日前からパシタ末1gを内服 制吐剤として下記の内服を検討する ・オランザピン錠5mg/day(Day1-4)													
根拠文献															
その他															