

Nivo+CDDP (orCBDCA)+GEM

対象の疾患	非小細胞肺癌
-------	--------

	投与順	薬剤	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール														
						1日目	...	8日目	...	21日目										
治療内容	No1	ソルテ`ム3A	500mL	120分	i.v	●														
	No2	パロ/セトロン	0.75mg	30分	i.v	●														
		デキサメタゾン	9.9mg																	
		ホスアプレピタント	150mg																	
	No3	グラニセトロン	3mg	30分	i.v				●											
		デキサメタゾン	9.9mg																	
	No4	ソルテ`ム3A	500mL	120分	i.v	●														
		硫酸Mg補正液	10mEq																	
	No5	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	i.v	●			●											
		生理食塩液	100mL																	
No6	20%マンニトール	300mL	60分	i.v	●															
No7 ^{※1}	シスプラチン	80mg/m ² ※2	120分	i.v	●															
	生理食塩液	500mL																		
	or																			
	カルボプラチン	AUC=5	60分																	
		生理食塩液	250mL																	
No8	ソルテ`ム3A	500mL	120分	i.v	●			●												
No9	ソルテ`ム3A	500mL	120分	i.v	●															
	硫酸Mg補正液	10mEq																		
No10	ニボルマブ	360mg	30分	i.v	●															
	生理食塩液	100mL																		
総投与時間	120~570分																			
1サイクル期間	21日間																			
ポスト・プレ メディケーション	制吐剤として下記の内服を検討する ・オランザピン錠5mg/day(Day1-4)																			
根拠文献	Neoadjuvant Nivolumab plus Chemotherapy in Resectable Lung Cancer : N ENGL J MED 386;21 NEJM.OGR MAY26,2022																			
その他	※1:カルボプラチン使用の場合はNo1、4、6、8、9のハイドレーションは不要 ※2:根拠文献と投与量異なるが医師と検討(2023/5/11)し記載の投与量で治療を行う																			