

Nivo+CDDP (orCBDCA)+PEM

対象の疾患		非小細胞肺がん												
治療内容	投与順	薬剤	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール								
						1日目	・・・	8日目	・・・	21日目				
	No1	ソルテム3A	500mL	120分	i.v	●								
	No2	パロノセトロン	0.75mg	30分	i.v	●								
		デキサメタゾン	9.9mg											
		ホスアプレピタント	150mg											
	No3	ソルテム3A	500mL	120分	i.v	●								
		硫酸Mg補正液	10mEq											
	No4	ペムレキセト	500mg/m ²	30分	i.v	●								
		生理食塩液	100mL											
	No5	20%マンニトール	300mL	60分	i.v	●								
	No6※1	シスプラチン	80mg/m ² ※2	120分	i.v	●								
		生理食塩液	500mL											
		or		60分										
		カルボプラチン	AUC＝5											
		生理食塩液	250mL											
	No7	ソルテム3A	500mL	120分	i.v	●								
	No8	ソルテム3A	500mL	120分	i.v	●								
		硫酸Mg補正液	10mEq											
	No9	ニボルマブ	360mg	30分	i.v	●								
生理食塩液		100mL												
総投与時間		570分												
1サイクル期間		21日間												
ポスト・プレ メディケーション		PEM ・ビタミンB12・1mgを筋注（9週毎） 投与7日前からパンプ末1gを内服 制吐剤として下記の内服を検討する ・オランザピン錠5mg/day(Day1-4)												
根拠文献		Neoadjuvant Nivolumab plus Chemotherapy in Resectable Lung Cancer : N ENGL J MED 386;21 NEJM.OCR MAY26,2022												
その他		※1:カルボプラチン使用の場合はNo1、3、5、7、8のハイドレーションは不要 ※2:根拠文献と投与量異なるが医師と検討(2023/5/11)し記載の投与量で治療を行う												