

Pembro+CBDCA+PEM

対象の疾患		非小細胞肺癌												
治療内容	投与順	薬剤	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール								
						1日目	・・・	21日目						
	①													
	No1	グラニセロン	3mg	30分	i.v	●								
		デキサメタゾン	9.9mg											
		ホスアプレピタント	150mg											
	No2	ペムレキセト	500mg/m ²	10分	i.v	●								
		生理食塩液	100mL											
	No3	カルボプラチン	AUC=5	60分	i.v	●								
		生理食塩液	250mL											
	No4	ペムプロリスマブ	200mg	30分	i.v	●								
		生理食塩液	100mL											
	②													
	No1	グラニセロン	3mg	30分	i.v	●								
		デキサメタゾン	9.9mg											
	No2	ペムレキセト	500mg/m ²	10分	i.v	●								
		生理食塩液	100mL											
	No3	ペムプロリスマブ	200mg	30分	i.v	●								
		生理食塩液	100mL											
総投与時間		130~190分												
1サイクル期間		21日間 ①4コース→②PDまたは許容できない副作用発現まで												
ポスト・プレ メディケーション		PEM ・ピタミンB12・1mgを筋注（9週毎） 投与7日前からピタミン末1gを内服 制吐剤として下記の内服を検討する ・デキサメタゾン8mg/day（Day2-3） ・オランザピン錠5mg/day(Day1-4)												
根拠文献		Pembrolizumab plus Chemotherapy in Metastatic Non–Small-Cell Lung Cancer: N Engl J Med 2018;378:2078-92.DOI: 10.1056/NEJMoa1801005												
その他														