

Pembro+CBDCA+nab-PTX

対象の疾患	非小細胞肺癌
-------	--------

	投与順	薬剤	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール							
						1日目	...	8日目	...	15日目	...	21日目	
治療内容	①												
	No1	グラニセロン	3mg	30分	i.v	●							
		デキサメタゾン	9.9mg										
		ホスアプレピタント	150mg										
	No2	グラニセロン	3mg	30分	i.v				●		●		
		デキサメタゾン	6.6mg										
	No3	パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	100mg/m ²	30分	i.v	●			●		●		
		生理食塩液	50mL										
	No4	カルボプラチン	AUC=5 [※]	60分	i.v	●							
		生理食塩液	250mL										
No5	ペムブロリズマブ	200mg	30分	i.v	●								
	生理食塩液	100mL											
	②												
	No1	ペムブロリズマブ	200mg	30分	i.v	●							
		生理食塩液	100mL										
総投与時間	30～150分												
1サイクル期間	21日間 ①4コース→②PDまたは許容できない副作用発現まで												
ポスト・プレ メディケーション													
根拠文献	Pembrolizumab plus Chemotherapy for Squamous Non-Small-Cell Lung Cancer:n engl j med 379;21 nejm.org November 22, 2018												
その他	※根拠文献と投与量異なるが医師と検討し記載の投与量で治療を行う												