

Pembro+CDDP+PEM

対象の疾患		非小細胞肺がん												
治療内容	投与順	薬剤	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール								
	①					1日目	・・・	21日目						
	No1	ソルデム3A	500mL	120分	i.v	●								
	No2	パロセトロン	0.75mg	30分	i.v	●								
		デキサメタゾン	9.9mg											
		ホスアプレピタント	150mg											
	No3	ソルデム3A	500mL	120分	i.v	●								
		硫酸Mg補正液	10mEq											
	No4	ペムトレキセト	500mg/m ²	10分	i.v	●								
		生理食塩液	100mL											
	No5	20%マンニトール	300mL	60分	i.v	●								
	No6	シスプラチン	75mg/m ²	120分	i.v	●								
		生理食塩液	500mL											
	No7	ソルデム3A	500mL	120分	i.v	●								
	No8	ソルデム3A	500mL	120分	i.v	●								
		硫酸Mg補正液	10mEq											
	No9	ペムブロリスマブ	200mg	30分	i.v	●								
		生理食塩液	100mL											
	②													
	No1	ペムブロリスマブ	200mg	30分	i.v	●								
		生理食塩液	100mL											
総投与時間		30～540分												
1サイクル期間		21日間 ①最大4コース→②最大13コース												
ポスト・プレ メディケーション		PEM ・ビタミンB12・1mgを筋注（9週毎） 投与7日前からパントパミド末1gを内服 制吐剤として下記の内服を検討する ・オランザピン錠5mg/day(Day1-4)												
根拠文献		Perioperative Pembrolizumab for Early-Stage Non-Small-Cell Lung Cancer:N ENGL J MED 389;6 NeJm.ORG AUGUST10,2023												
その他														