

Pembro+CDDP+GEM

対象の疾患		非小細胞肺癌												
治療内容	投与順	薬剤	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール								
						1日目	・・・	8日目	・・・	21日目				
	①													
	No1	ソルデ`ム3A	500mL	120分	i.v	●								
	No2	パロノセトロン	0.75mg	30分	i.v	●								
		デキサメタゾン	9.9mg											
		ホスアプレピタント	150mg											
	No3	グラニセトロン	3mg	30分	i.v			●						
		デキサメタゾン	9.9mg											
	No4	ソルデ`ム3A	500mL	120分	i.v	●								
		硫酸Mg補正液	10mEq											
	No5	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	i.v	●		●						
		生理食塩液	100mL											
	No6	20%マンニトール	300mL	60分	i.v	●								
	No7	シスプラチン	80mg/m ²	120分	i.v	●								
		生理食塩液	500mL											
	No8	ソルデ`ム3A	500mL	120分	i.v	●		●						
	No9	ソルデ`ム3A	500mL	120分	i.v	●								
		硫酸Mg補正液	10mEq											
	No10	ペムブ`ロリス`マブ`	200mg	30分	i.v	●								
		生理食塩液	100mL											
	②													
	No1	ペムブ`ロリス`マブ`	200mg	30分	i.v	●								
		生理食塩液	100mL											
総投与時間		30~540分												
1サイクル期間		21日間 ①最大4コース→②最大13コース												
ポスト・プレ メディケーション		制吐剤として下記の内服を検討する ・オランザ`ビン錠5mg/day(Day1-4)												
根拠文献		Perioperative Pembrolizumab for Early-Stage Non-Small-Cell Lung Cancer:N ENGL J MED 389;6 NeJm.ORG AUGUST10,2023												
その他														