

Tarlatamab単剤

対象の疾患		小細胞肺がん												
治療内容	投与順	薬剤	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール								
						1日目	・・・	8日目	・・・	15日目	・・・	28日目		
	サイクル1													
	No.1	デキサメタゾン	6.6mg	30分	i.v	●		●						
		生理食塩液	100mL											
	No.2	タルラタマブ	1mg	60分	i.v	●※1								
		生理食塩液	250mL											
	No.3	タルラタマブ	10mg	60分	i.v			●※2		●				
		生理食塩液	250mL											
	No.4	生理食塩液	1000mL	4～5時間	i.v	●		●		●				
サイクル2以降														
No.1	タルラタマブ	10mg	60分	i.v	●				●					
	生理食塩液	250mL												
総投与時間		サイクル1 Day1,2:330～390分 サイクル1Day15・サイクル2以降:60分												
1サイクル期間		28日間												
ポスト・プレ メディケーション		CRSを軽減するため1サイクル目Day1および8の投与前にデキサメタゾン6.6mgを投与する また1サイクル目Day1・8・15の本剤投与後に輸液を行う												
根拠文献		Tarlatamab for Patients with Previously Treated Small-Cell Lung Cancer :N engl j med 389;22 nejm.org november 30, 2023												
その他		適正使用ガイドに点滴時に輸液バックから空気を抜くとあるが、 正確に滴下できない可能性があるため行わない。 PVCフリーは使用しない ※1、2は投与開始から24時間以内は必ず入院管理 溶解後室温での保存は8時間												