

Amivan+CBDCA+PEM

対象の疾患	小細胞肺がん
-------	--------

投与順	薬剤	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール													
					1日目	2日目	...	8日目	...	15日目	...	21日目	...	日目				
サイクル1																		
No1	グラニセロン	3mg	30分	i.v	●													
	デキサメタゾン	9.9mg																
	ホスアプレピタント	150mg																
No2	ペムレキセト	500mg/m ²	10分	i.v	●													
	生理食塩液	100mL																
No3	カルボプラチン	AUC=5	60分	i.v	●													
	生理食塩液	250mL																
No4	クロルフェニラミンマレイン酸塩	5mg	15分	i.v	●													
	アセトアミノフェン	1000mg																
No5	生理食塩液	50mL	5分	i.v	●													
No6	アミバンタマブ	350mg	※1	i.v	●													
	生理食塩液	全量250mL																
No7	デキサメタゾン	9.9mg	15分	i.v			●											
	クロルフェニラミンマレイン酸塩	5mg																
	アセトアミノフェン	1000mg																
No8	生理食塩液	50mL	5分	i.v		●												
No9	アミバンタマブ (80kg未満)	1050mg	※1	i.v			●											
	(80kg以上)	1400mg																
	生理食塩液	全量250mL																
No10	クロルフェニラミンマレイン酸塩	5mg	15分	i.v					●		●							
	アセトアミノフェン	1000mg																
No11	生理食塩液	50mL	5分	i.v				●		●								
No12	アミバンタマブ (80kg未満)	1400mg	※1	i.v					●		●							
	(80kg以上)	1750mg																
	生理食塩液	全量250mL																
サイクル2																		
No1	グラニセロン	3mg	30分	i.v	●													
	デキサメタゾン	9.9mg																
	ホスアプレピタント	150mg																
No2	ペムレキセト	500mg/m ²	10分	i.v	●													
	生理食塩液	100mL																
No3	カルボプラチン	AUC=5	60分	i.v	●													
	生理食塩液	250mL																

治療内容

Amivan+CBDCA+PEM

No4	クロルフェニラミンレイン酸塩	5mg	15分	i.v	●																
	アセトアミノフェン	1000mg																			
No5	生理食塩液	50mL	5分	i.v	●																
No6	アミバンタマブ [®] (80kg未満)	1400mg	※1	i.v	●																
	(80kg以上)	1750mg																			
	生理食塩液	全量250mL																			
サイクル3・4																					
No1	グラニセロン	3mg	30分	i.v	●																
	デキサメタゾン	9.9mg																			
	ホスアプレピタント	150mg																			
No2	ペムレキセト [®]	500mg/m ²	10分	i.v	●																
	生理食塩液	100mL																			
No3	カルボプラチン	AUC=5	60分	i.v	●																
	生理食塩液	250mL																			
No4	クロルフェニラミンレイン酸塩	5mg	15分	i.v	●																
	アセトアミノフェン	1000mg																			
No5	生理食塩液	50mL	5分	i.v	●																
No6	アミバンタマブ [®] (80kg未満)	1750mg	※1	i.v	●																
	(80kg以上)	2100mg																			
	生理食塩液	全量250mL																			
サイクル5以降																					
No1	グラニセロン	3mg	30分	i.v	●																
	デキサメタゾン	6.6mg																			
No2	ペムレキセト [®]	500mg/m ²	10分	i.v	●																
	生理食塩液	100mL																			
No4	クロルフェニラミンレイン酸塩	5mg	15分	i.v	●																
	アセトアミノフェン	1000mg																			
No5	生理食塩液	50mL	5分	i.v	●																
No6	アミバンタマブ [®] (80kg未満)	1750mg	※1	i.v	●																
	(80kg以上)	2100mg																			
	生理食塩液	全量250mL																			
総投与時間	3~6時間 ※1:適正使用ガイドを参照																				
1サイクル期間	21日間																				
ポスト・プレ メディケーション	Amivan ・Infusion reaction 予防にC1D1投与前2日間デキサメタゾン16mg/dayを内服 PEM ・ビタミンB12・1mgを筋注(9週毎) 投与7日前からバンピタム末1gを内服 制吐剤として下記の内服を検討する ・デキサメタゾン8mg/day (Day2-3: サイクル1のDay2は不要)																				
根拠文献	Amivantamab plus Chemotherapy in NSCLC with EGFR Exon 20 Insertions : N engl j med 389;22 nejm.org november 30, 2023																				

Amivan+CBDCA+PEM

その他	<p>Amivan</p> <ul style="list-style-type: none">・投与時にはインラインフィルターを使用・溶解後は10時間以内に投与・低Mg血症のため投与開始まえに測定を行う・HFS他皮膚障害予防のため保湿を投与開始から行う・皮膚障害出現時にはミノサイクリン塩酸塩錠100mg/dayの投与と外用ステロイド剤の使用を検討する
-----	---